

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de cadera por artrosis
IMAE Asociación Española. Año 2007

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

	Asoc. Española	Valor nacional
Número de procedimientos realizados	233	1288
Mortalidad operatoria¹ (IC 95%)	0,0% (0 – 1,3)	0,4% (0,1 – 0,9)
Mortalidad al año (IC 95%)	1,7% (0,5 – 4,3)	1,4% (0,3 – 2,3)
Infección de sitio quirúrgico al año² (IC 95%)	0,9% (0 – 2,58)	2,6% (1,2 – 3,5)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año³ (IC 95%)	3,4% (1,7 – 6,4)	5,2% (3,5 – 6,6)
Luxación al año (IC 95%)	2,6% (1,3 – 5,6)	2,6% (1,6 – 3,9)
Resultados funcionales al año⁴		
Caminan solos fuera de la casa	85,3%	87,1%
Incapaces de caminar	0,9%	0,9%
Caminan sin ayuda	69,1%	68,1%
En cama o silla de ruedas	0,9%	1,1%
Sin dolor	73,2%	75,0%
Con dolor severo	2,2%	1,1%

¹ A 30 días de la cirugía, se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

² Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

³ Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

⁴ Se excluyeron los procedimientos en pacientes que fallecieron antes del año de la artroplastia