

**Resumen de datos de resultados<sup>1</sup>**  
**Artroplastia de rodilla**  
**IMAE Sanatorio Americano**

	S. Americano	Total del país
<b>Informe año 2001<sup>2</sup></b>		
Total de pacientes	49	180
Complicaciones traumatológicas <sup>3</sup>	8,2%	6,2%
Complicaciones médicas <sup>4</sup>	4,1%	5%
Complicaciones infecciosas <sup>5</sup>	14,3%	7,8%
Reinternaciones	8,9%	11,7%
Reintervenciones	2%	2,8%
<b>Informe año 2002<sup>6</sup></b>		
Total de pacientes	38	108 <sup>7</sup>
Complicaciones infecciosas	7,9%	10,2%
Reinternaciones	5,3%	5,6%
Reintervenciones	5,3%	1,9%
<b>Informe año 2005<sup>8</sup></b>		
Total de pacientes	73	243
Complicaciones infecciosas	1,4%	6,6%
Reinternaciones	4,1%	5,8%
Autonomía para la marcha <sup>9</sup>	63,9%	58,8%
Ausencia de dolor <sup>10</sup>	56,9%	47,1%
Reintegro a actividades	61,1%	48,6%

<sup>1</sup> Los datos permiten la comparación de cada IMAE con los datos nacionales obtenidos en el mismo estudio. Hay variaciones en la metodología que pueden afectar la comparación entre estudios sucesivos.

<sup>2</sup> El informe de marzo 2001 incluye los implantes realizados entre diciembre 1999 y febrero 2000 evaluados a los 6 meses de la intervención

<sup>3</sup> Incluye luxación, sangrado, fractura

<sup>4</sup> Incluye insuficiencia cardíaca, arritmia, infarto, AVE, deterioro cognitivo, estado confusional, infección urinaria, infección asociada a catéter venoso y neumonía

<sup>5</sup> Incluye los casos diagnosticados y la presencia de síntomas inflamatorios a nivel de la herida operatoria asociada a herida abierta con drenaje o mojada con material purulento que requirió tratamiento específico

<sup>6</sup> El informe de 2002 incluye los implantes realizados entre noviembre 2001 y enero 2002. Este estudio es prospectivo por lo cual la metodología es sustancialmente diferente a los otros dos

<sup>7</sup> Se hicieron 108 implantes en 107 pacientes

<sup>8</sup> El informe de 2005 incluye los implantes realizados entre noviembre 2004 y febrero 2005 evaluados a los 2 a 3 meses de la intervención

<sup>9</sup> Incluye los pacientes capaces de caminar fuera de la casa sin acompañante, según la escala de movilidad de Parker

<sup>10</sup> Incluye los pacientes que manifestaron no sentir dolor, según la escala de Charnley modificada