

FONDO NACIONAL DE RECURSOS

Programa de evaluación de resultados: datos de angioplastia coronaria IMAE Casa de Galicia. Año 2012

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

	Casa de Galicia	Valor nacional ¹
Total de pacientes tratados ²	591	3372
Angioplastia primaria dentro de las 6 horas del inicio del infarto ³	79,1%	74,3%
Mortalidad cruda a 30 días del procedimiento		
Pacientes sin infarto de miocardio (IAM)	4,5% (*)	1,6%
Pacientes con IAM sin inestabilidad hemodinámica	8,6%	6,1%
Pacientes con IAM con inestabilidad hemodinámica o shock	50,0%	33,3%
Total de pacientes estandarizada ⁴	6,99% (*)	3,94%
Mortalidad a 30 días ajustada por modelo logístico nacional ⁵		
Mortalidad observada / mortalidad esperada ajustada para población 2003-2006	1,93 (*)	1,18
Mortalidad observada / mortalidad esperada ajustada a la población 2012	1,68 (*)	1,0
Nuevo procedimiento de revascularización a 6 meses ⁶		
Nueva revascularización a 6 meses	13,5% (*)	9,4%
Nueva revascularización no programada a 6 meses	8,4% (*)	4,5%
Nueva revascularización a 6 meses sobre misma lesión	8,0% (*)	3,6%

¹ El valor nacional corresponde al valor observado en el total de los procedimientos realizados en los IMAE con cobertura del FNR.

² El análisis incluye el total de pacientes tratados en el año 2012 con cobertura del FNR

³ Se consideran los pacientes con IAM tratados con angioplastia primaria en quienes el procedimiento se realizó dentro de 6 horas de inicio del IAM

⁴ Se considera el total de pacientes independientemente de la situación clínica

⁵ En este caso, la mortalidad está ajustada en base a un modelo local en base a la población total de procedimientos que se realizaron en el Uruguay con cobertura del FNR entre enero de 2003 y diciembre de 2006. Ese modelo se aplicó a la población tratada en 2012. Este ajuste permite la comparación entre centros nacionales en la perspectiva histórica, corrigiendo la interferencia que podrían generar los distintos perfiles de riesgo de los pacientes tratados.

El modelo también se calibró a la población del año 2012. Este ajuste permite la comparación entre centros nacionales, corrigiendo la interferencia que podrían generar los distintos perfiles de riesgo de los pacientes tratados en el año 2012.

⁶ Se considera la realización de nueva angioplastia o cirugía de revascularización coronaria