

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de cadera por artrosis
IMAE Sanatorio Americano. Año 2007

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

	Sanatorio Americano	Valor nacional
Número de procedimientos realizados	434	1288
Mortalidad operatoria¹ (IC 95%)	0,0% (0 – 0,7)	0,4% (0,1 – 0,9)
Mortalidad al año (IC 95%)	0,9% (0 – 0,7)	1,4% (0,3 – 2,3)
Infección de sitio quirúrgico al año² (IC 95%)	2,8% (1,2 – 5,8)	2,6% (1,2 – 3,5)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año³ (IC 95%)	4,6% (2,1 – 7,8)	5,2% (3,5 – 6,6)
Luxación al año (IC 95%)	1,2% (0,2 – 3,2)	2,6% (1,6 – 3,9)
Resultados funcionales al año⁴		
Caminan solos fuera de la casa	88,5%	87,1%
Incapaces de caminar	0,5%	0,9%
Caminan sin ayuda	67,4%	68,1%
En cama o silla de ruedas	1,2%	1,1%
Sin dolor	71,4% (*)	75,0%
Con dolor severo	1,2%	1,1%

¹ A 30 días de la cirugía, se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

² Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

³ Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

⁴ Se excluyeron los procedimientos en pacientes que fallecieron antes del año de la artroplastia