

Resumen de datos de resultados¹
Artroplastia de cadera
IMAE Sanatorio Americano

| | Sanatorio Americano | Total del país |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | |
| Informe año 2001² | | |
| Total de pacientes | 57 | 279 |
| Complicaciones traumatológicas ³ | 1,8% | 1,8% |
| Complicaciones médicas ⁴ | 10,5% | 4,7% |
| Complicaciones infecciosas ⁵ | 5,3% | 3,9% |
| Reinternaciones | 7% | 7,5% |
| Reintervenciones | 1,8% | 1,4% |

Informe año 2005⁶

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Total de pacientes | 119 | 350 |
| Complicaciones infecciosas | 4,2% | 4,6% |
| Reinternaciones | 0,8% | 2,3% |
| Autonomía para la marcha ⁷ | 66,1% | 62,5% |
| Ausencia de dolor ⁸ | 61,9% | 68,6% |
| Reintegro a actividades | 45,8% | 48,6% |
| Mortalidad | 0 | 0,3% |

¹ Los datos permiten la comparación de cada IMAE con los datos nacionales obtenidos en el mismo estudio. Algunas variaciones en la metodología pueden afectar la comparación entre estudios sucesivos.

² El informe de marzo 2001 incluye los implantes realizados entre diciembre 1999 y febrero 2000 evaluados a los 6 meses de la intervención

³ Incluye luxación, sangrado, fractura

⁴ Incluye insuficiencia cardíaca, arritmia, infarto, AVE, deterioro cognitivo, estado confusional, infección urinaria, infección asociada a catéter venoso y neumonía

⁵ Incluye los casos diagnosticados y la presencia de síntomas inflamatorios a nivel de la herida operatoria asociada a herida abierta con drenaje o mojada con material purulento que requirió tratamiento específico

⁶ El informe de 2005 incluye los implantes realizados entre noviembre 2004 y febrero 2005 evaluados a los 2 a 3 meses de la intervención

⁷ Incluye los pacientes capaces de caminar fuera de la casa sin acompañante, según la escala de movilidad de Parker

⁸ Incluye los pacientes que manifestaron no sentir dolor, según la escala de Charnley modificada