

Resumen de datos de resultados¹
Artroplastia de rodilla
IMAE Banco de Prótesis

| | Banco de Prótesis | Total del país |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Informe año 2001² | | |
| Total de pacientes | 83 | 180 |
| Complicaciones traumatológicas ³ | 8,4% | 6,2% |
| Complicaciones médicas ⁴ | 7,2% | 5% |
| Complicaciones infecciosas ⁵ | 7,2% | 7,8% |
| Reinternaciones | 16,9% | 11,7% |
| Reintervenciones | 4,8% | 2,8% |
| Informe año 2002⁶ | | |
| Total de pacientes | 49 | 108 ⁷ |
| Complicaciones infecciosas | 10,2% | 10,2% |
| Reinternaciones | 6,1% | 5,6% |
| Reintervenciones | 0 | 1,9% |
| Informe año 2005⁸ | | |
| Total de pacientes | 97 | 243 |
| Complicaciones infecciosas | 8,2% | 6,6% |
| Reinternaciones | 4,1% | 5,8% |
| Autonomía para la marcha ⁹ | 54,6% | 58,8% |
| Ausencia de dolor ¹⁰ | 42,1% | 47,1% |
| Reintegro a actividades | 58,8% | 48,6% |

¹ Los datos permiten la comparación de cada IMAE con los datos nacionales obtenidos en el mismo estudio. Hay variaciones en la metodología que pueden afectar la comparación entre estudios sucesivos.

² El informe de marzo 2001 incluye los implantes realizados entre diciembre 1999 y febrero 2000 evaluados a los 6 meses de la intervención

³ Incluye luxación, sangrado, fractura

⁴ Incluye insuficiencia cardíaca, arritmia, infarto, AVE, deterioro cognitivo, estado confusional, infección urinaria, infección asociada a catéter venoso y neumonía

⁵ Incluye los casos diagnosticados y la presencia de síntomas inflamatorios a nivel de la herida operatoria asociada a herida abierta con drenaje o mojada con material purulento que requirió tratamiento específico

⁶ El informe de 2002 incluye los implantes realizados entre noviembre 2001 y enero 2002. Este estudio es prospectivo por lo cual la metodología es sustancialmente diferente a los otros dos

⁷ Se hicieron 108 implantes en 107 pacientes

⁸ El informe de 2005 incluye los implantes realizados entre noviembre 2004 y febrero 2005 evaluados a los 2 a 3 meses de la intervención

⁹ Incluye los pacientes capaces de caminar fuera de la casa sin acompañante, según la escala de movilidad de Parker

¹⁰ Incluye los pacientes que manifestaron no sentir dolor, según la escala de Charnley modificada