

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de rodilla
IMAE Sanatorio Americano. Año 2007

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

	Sanatorio Americano	Valor nacional
Número de procedimientos realizados	230	730
Mortalidad operatoria¹ (IC 95%)	0,0% (0 – 1,3)	0,0% (0 – 0,4)
Mortalidad al año (IC 95%)	2,2% (0,7 – 5)	1,9% (1 – 3,2)
Infección de sitio quirúrgico al año² (IC 95%)	4,3% (1,3 – 9,6)	3,6% (2,1 – 5,9)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año³ (IC 95%)	7,8% (3,5 – 13,5)	7,1% (4,5 – 9,6)
Luxación al año (IC 95%)	0,0% (0 – 2,7)	0,3% (0 – 1,6)
Resultados funcionales al año⁴		
Caminan solos fuera de la casa	86,8%	87,2%
Incapaces de caminar	0,0%	0,0%
Caminan sin ayuda	70,0%	66,3%
En cama o silla de ruedas	0,0%	0,0%
Sin dolor	59,9%	59,2%
Con dolor severo	2,2%	1,8%

¹ A 30 días de la cirugía, se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

² Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

³ Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

⁴ Se excluyeron los procedimientos en pacientes que fallecieron antes del año de la artroplastia