

**FONDO NACIONAL DE RECURSOS**  
**Programa de evaluación de resultados: datos de cirugía cardíaca**  
**IMAE Casa de Galicia. Año 2015**

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. Salvo cuando se establece lo contrario, los valores deben ser los más bajos posibles. En los casos señalados con (\*) la diferencia es estadísticamente significativa.

<b>CIRUGIA CORONARIA PURA (N = 340)</b>	<b>C de Galicia</b>	<b>Valor nacional<sup>1</sup></b>
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	<b>8.9% (*)</b>	15.2%
Reintervención antes del egreso	2.1%	4.1%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía <sup>2</sup>	99.7%	99.6%
Mortalidad operatoria cruda <sup>3</sup>	2.6%	3.7%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	1.2%	1.4%
<b>PRIMERA CIRUGIA CORONARIA PURA (N = 338)</b>	<b>C de Galicia</b>	<b>Valor nacional</b>
Utilización de puente con mamaria interna <sup>4</sup>	97.3%	97.3%
Mortalidad operatoria cruda	2.4%	3.7%
<b>CIRUGÍA VALVULAR PURA (N = 76)</b>	<b>C de Galicia</b>	<b>Valor nacional</b>
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	14.9%	13.4%
Reintervención antes del egreso	7.9%	7.0%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	99.2%
Mortalidad operatoria cruda	5.3%	5.0%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	1.4%	1.6%
<b>CIRUGÍA COMBINADA (N = 56)</b>	<b>C de Galicia</b>	<b>Valor nacional</b>
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	24.1%	30.4%
Reintervención antes del egreso	7.3%	8.3%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	98.2%	99.3%
Mortalidad operatoria cruda	8.9%	9.6%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0.0%	0.4%
<b>CIRUGÍA AÓRTICA FUERA DE LA EMERGENCIA (N = 13)</b>	<b>C de Galicia</b>	<b>Valor nacional</b>
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	46.2%	38.6%
Reintervención antes del egreso	15.4%	18.2%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	100%
Mortalidad operatoria cruda	7.7	10%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0.0%	0.0%
<b>MORTALIDAD AJUSTADA POR RIESGO PREOPERATORIO<sup>5</sup></b>	<b>C de Galicia</b>	<b>Valor nacional</b>
Relación mortalidad observada / mortalidad esperada <sup>6</sup>	0.87	0.97

<sup>1</sup> El valor nacional corresponde al valor observado en el total de los procedimientos realizados en los IMAE con cobertura del FNR.

<sup>2</sup> En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible.

<sup>3</sup> Proporción de pacientes fallecidos a los 30 días de la cirugía.

<sup>4</sup> En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible ya que se recomienda el uso de mamaria siempre que sea factible.

<sup>5</sup> Se utilizó el modelo logístico del EuroSCORE ajustado a la población uruguaya operada en el período enero 2003 a diciembre de 2006. Se incluyen todos los tipos de cirugía.

<sup>6</sup> Los valores superiores a 1 significan que la mortalidad observada fue superior a la esperable de acuerdo al riesgo. Al contrario, los valores menores a 1 significan que la observada fue inferior a la esperable.