

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: datos de cirugía cardíaca
IMAE Sanatorio Americano. Año 2020

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. Salvo cuando se establece lo contrario, los valores deben ser los más bajos posibles. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

CIRUGIA CORONARIA PURA (N = 252)	S. Americano	Valor nacional ¹
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	25,8%	14,3%
Reintervención antes del egreso	6,0%	3,4%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía ²	99,6%	98,1%
Mortalidad operatoria cruda ³	2,3%	2,8%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0,4%	0,6%

PRIMERA CIRUGIA CORONARIA PURA (N = 251)	S. Americano	Valor nacional
Utilización de puente con mamaria interna ⁴	92,8%	95,7%
Mortalidad operatoria cruda	4,0%	4,0%

CIRUGÍA COMBINADA (N = 55)	S. Americano	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	45,5%	29,6%
Reintervención antes del egreso	14,8%	8,5%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	94,0%
Mortalidad operatoria cruda	12,7%	11,1%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	6,7% *	2,2%

CIRUGÍA VALVULAR PURA (N = 154)	S. Americano	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	17,0%	14,5%
Reintervención antes del egreso	9,1%	6,8%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	95,8%
Mortalidad operatoria cruda	5,2%	7,3%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0,7%	0,5%

CIRUGÍA AÓRTICA FUERA DE LA EMERGENCIA (N = 20)	S. Americano	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	40,0%	33,7%
Reintervención antes del egreso	10,0%	14,3%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	91,9%
Mortalidad operatoria cruda	5,0%	10,5%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0,0%	0,0%

MORTALIDAD AJUSTADA POR RIESGO PREOPERATORIO ⁵	S. Americano	Valor nacional
Relación mortalidad observada / mortalidad esperada ⁶	1,07	1.14

¹ El valor nacional corresponde al valor observado en el total de los procedimientos realizados en los IMAE con cobertura del FNR.

² En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible.

³ Proporción de pacientes fallecidos a los 30 días de la cirugía.

⁴ En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible ya que se recomienda el uso de mamaria siempre que sea factible.

⁵ Se utilizó el modelo logístico del EuroSCORE ajustado a la población uruguaya operada en el período enero 2003 a diciembre de 2006. Se incluyen todos los tipos de cirugía.

⁶ Los valores superiores a 1 significan que la mortalidad observada fue superior a la esperable de acuerdo al riesgo. Al contrario, los valores menores a 1 significan que la observada fue inferior a la esperable.