

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de cadera por artrosis
IMAE Asociación Española. Año 2008

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

	Asoc. Española	Valor nacional
Número de procedimientos realizados	22 6	1279
Mortalidad operatoria¹ (IC 95%)	0,4 % (0,01 – 2,4)	0,5% (0,1 – 1,0)
Mortalidad al año (IC 95%)	1,3 % (0,3 – 3,8)	1,4% (0,8 – 2,2)
Infección de sitio quirúrgico al año² (IC 95%)	0,0 % (0 – 2,7)	1,3% (0,3 – 2,6)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año³ (IC 95%)	0,9 % (0,0 – 4,9)	2,3% (1,0 – 4,0)
Luxación al año (IC 95%)	2,2 % (0,4 – 6,2)	0,8% (0,3 – 2,6)
Resultados funcionales al año⁴		
Caminan solos fuera de la casa	87,0%	88,0%
Incapaces de caminar	0,0%	0,7%
Caminan sin ayuda	67,0%	69,0%
En cama o silla de ruedas	0,0%	0,7%
Sin dolor	82,0%	82,0%
Con dolor severo	2,2%	0,7%
Incidencia Solicitud de Recambios⁵		
Incidencia a un año	0,44%	0,16%
Incidencia a tres años	0,88%	0,78%
Incidencia a cinco años	1,77%	1,88%

1 A 30 días de la cirugía, se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

2 Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

3 Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

4 Se excluyeron los procedimientos en pacientes que fallecieron antes del año de la artroplastia

5 Incidencia de solicitud de recambios estimada mediante análisis de riesgo competitivo (ver anexo metodológico)