

Variable	Coefficiente	OR (IC 95%)	Prevalencia* Uruguay 03-06 N= 3146	Prevalencia** Uruguay 2007 N= 842	Prevalencia*** Uruguay 2008 N= 820
Edad (años por encima de 74)	0,04910	1,050 (1,028-1,073)	79,4 (8,5) #	79,9 (8,4) #	79,5 (8,2) #
Sexo masculino	0,56507	1,76 (1,36-2,28)	18,3%	18,8%	17,1%
Insuficiencia Renal	0,42508	1,53 (0,96-2,5)	3,9%	3,9%	4,3%
Enfermedad de Parkinson	0,46299	1,59 (1,05-2,15)	5,5%	3,7%	3,4%
Diabetes	0,45492	1,58 (1,16-2,14)	11,8%	13,2%	11,5%
Cáncer Diseminado	2,09392	8,12 (4,03-16,35)	1,2%	1,7%	1,4%
Comorbilidad Respiratoria	0,34769	1,42 (1,06-1,89)	14,1%	13,1%	14,1%
Demencia	0,54571	1,73 (0,95-3,14)	2,1%	2,1%	3,6%
Hemi-artroplastia	0,91151	2,49 (1,83-3,39)	57,2%	60,5%	57,7%
Días entre fractura y cirugía	0,01378	1,014 (1,004-1,024)	6 (5 – 12) ##	6 (4 – 15) ##	6 (3 – 15,8)

ANEXO I

Modelo logístico uruguayo para ajuste del riesgo de la Mortalidad al año.

Desarrollado en la población de procedimientos realizados desde el año 2003 al año 2006

Intersección (α) = -3,36025

Media (desvío estándar)

Mediana (rango inter-cuartílico)

* Prevalencia de los factores considerados en el escore en la población a partir de la cual se desarrolló el escore (intervenciones realizadas en el período 2003-2006).

** Prevalencia de los factores considerados en el escore en la población intervenida en el año 2007.

*** Prevalencia de los factores considerados en el escore en la población intervenida en el año 2008.

Área bajo Curva ROC (Población Total 2003 – 2006) = 0,705 (IC 95%: 0,680– 0,730)

Hosmer – Lemeshow (Población Total 2003 – 2006) p = 0,189

R² Naegelkerke = 0,117

Área bajo Curva ROC (Población Total 2007) = 0,709 (IC 95%: 0,659 – 0,758)

Hosmer – Lemeshow (Población Total 2007) p = 0,239

Área bajo Curva ROC (Población Total 2008) = 0,674 (IC 95%: 0,618 – 0,729)

Hosmer – Lemeshow (Población Total 2007) p = 0,638