

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de rodilla
IMAE Asociación Española. Año 2008

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

	Asoc. Española	Valor nacional
Número de procedimientos realizados	29 3	948
Mortalidad operatoria¹ (IC 95%)	0,7 (0,08 % -2,4)	0,21 (0,03 – % 0,8)
Mortalidad al año (IC 95%)	3,1 (1,4 – % 5,8)	1,7 % (1 – 2,7)
Infección de sitio quirúrgico al año² (IC 95%)	1,1 (0,0 – % 4,4)	3,9 (2,1 – % 5,9)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año³ (IC 95%)	6,0 (2,4 % -10,9)	5,7 (3,3 – % 7,7)
Luxación al año (IC 95%)	0,0 % (0 – 2,4)	0,0 % (0 – 0,8)
Resultados funcionales al año⁴		
Caminan solos fuera de la casa	83,9%	84,5%
Incapaces de caminar	0,0%	0,0%
Caminan sin ayuda	67,7%	64,8%
En cama o silla de ruedas	0,0%	0,0%
Sin dolor	68,8%	73,0%
Con dolor severo	3,9%	1,9%
Incidencia Solicitud de Recambios⁵		
Incidencia a un año	0%	0,21%
Incidencia a tres años	1,02%	1,05%
Incidencia a cinco años	1,37%	1,16%

¹ A 30 días de la cirugía, se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

² Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

³ Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

⁴ Se excluyeron los procedimientos en pacientes que fallecieron antes del año de la artroplastia

⁵ -i incidencia de solicitud de recambios estimada mediante análisis de riesgo competitivo (ver anexo metodológico)

