

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de rodilla
IMAE Sanatorio Americano. Año 2008

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

	Sanatorio Americano	Valor nacional
Número de procedimientos realizados	27 8	948
Mortalidad operatoria¹ (IC 95%)	0,0 (0,0 - % 1,1)	0,21 (0,03 - % 0,8)
Mortalidad al año (IC 95%)	2,2 (0,08 - % 2,6)	1,7 % (1 - 2,7)
Infección de sitio quirúrgico al año² (IC 95%)	3,4 (1,1 - % 8,3)	3,9 (2,1 - % 5,9)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año³ (IC 95%)	2,9 (0,7 - % 6,8)	5,7 (3,3 - % 7,7)
Luxación al año (IC 95%)	0,0 % (0 - 2,5)	0,0 % (0 - 0,8)
Resultados funcionales al año⁴		
Caminan solos fuera de la casa	84,6 %	84,5%
Incapaces de caminar	0,0%	0,0%
Caminan sin ayuda	72,4%	64,8%
En cama o silla de ruedas	0,0%	0,0%
Sin dolor	76,4%	73,0%
Con dolor severo	1,1%	1,9%
Incidencia Solicitud de Recambios⁵		
Incidencia a un año	0,0%	0,21%
Incidencia a tres años	0,72%	1,05%
Incidencia a cinco años	0,72%	1,16%

¹ A 30 días de la cirugía, se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

² Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

³ Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

⁴ Se excluyeron los procedimientos en pacientes que fallecieron antes del año de la artroplastia

⁵ Incidencia de solicitud de recambios estimada mediante análisis de riesgo competitivo (ver anexo metodológico)