

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de cadera por artrosis.

IMAE. Sanatorio Americano. Año 2017

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

La metodología utilizada en éste estudio se encuentra disponible en el informe completo “Seguimiento post artroplastia de cadera y rodilla, resultados 12 meses. Año 2017” publicado en el año 2020 en nuestra página web.

	Sanatorio Americano	Valor Nacional
Número de procedimientos realizados	467	1794
Mortalidad operatoria cruda^{1,2} % (IC 95%)	0,43 (0,05 – 1,54)	0,22 (0,06 – 0,57)
Mortalidad cruda al año² % (IC 95%)	1,71 (0,74 – 3,35)	1,9 (1,32 – 2,64)
Infecciones de sitio quirúrgico profundas al año³ % (IC 95%)	2,4 (0,7 – 7,9)	1,5 (0,7 – 3,2)
Luxaciones al año % (IC 95%)	1,2 (0,2 – 6,6)	1,02 (0,5 – 2,8)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año⁴ % (IC 95%)	2,3 (0,7 -7,9)	2,2 (1,2 – 4,0)
Incidencia de solicitud de recambios al año⁵ % (IC 95%)	0,21 (0,16 – 0,29) *	0,39 (0,34 – 0,45)

1 A 30 días de la cirugía o antes del alta.

2 Se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

3 Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

4 Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

5 Incidencia de solicitud de recambios estimada mediante análisis de riesgo competitivo.