

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: artroplastia de rodilla.

IMAE Asociación Española. Año 2017

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

La metodología utilizada en éste estudio se encuentra disponible en el informe completo “Seguimiento post artroplastia de cadera y rodilla, resultados 12 meses. Año 2017” publicado en el año 2020 en nuestra página web.

	Asociación Española	Valor Nacional
Número de procedimientos realizados	510	1993
Mortalidad Operatoria cruda^{1,2} % (IC 95%)	0,59 (0,12 – 1,71)	0,2 (0,05 – 0,51)
Mortalidad cruda al año² % (IC 95%)	1,37 (0,55 – 2,81)	0,95 (0,57 – 1,48)
Infecciones de sitio quirúrgico profundas al año³ % (IC 95%)	10,8 (5,4 – 20,2)*	4,5 (2,8 – 7,4)
Luxaciones al año % (IC 95%)	0 (-)*	0,4 (0,1 – 2,3)
Nuevo procedimiento quirúrgico al año⁴ % (IC 95%)	12,3 (6,5 – 22,0)*	6,4 (4,1 – 9,6)
Incidencia de solicitud de recambios al año⁵ % (IC 95%)	0,59 (0,47 – 0,73)*	0,4 (0,35 – 0,46)

1 A 30 días de la cirugía o antes del alta.

2 Se consideraron todos los fallecimientos por todas las causas

3 Se incluyen las infecciones de sitio quirúrgico incisionales profundas y las de órgano / cavidad dentro del año de la artroplastia

4 Se consideraron todos los procedimientos quirúrgicos realizados por todas las causas

5 Incidencia de solicitud de recambios estimada mediante análisis de riesgo competitivo.