

FONDO NACIONAL DE RECURSOS

Programa de evaluación de resultados: datos de cirugía cardíaca

IMAE INCC. Año 2024

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. Salvo cuando se establece lo contrario, los valores deben ser los más bajos posibles. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

CIRUGIA CORONARIA PURA (N =84)	INCC	Valor nacional ¹
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	7,1%	7,9%
Reintervención antes del egreso	2,4%	5,0%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía ²	95,2*%	99,4%
Mortalidad operatoria cruda ³	3,6%	2,4%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0,0%	0,1%
PRIMERA CIRUGIA CORONARIA PURA (N = 83)	INCC	Valor nacional
Utilización de puente con mamaria interna ⁴	96,4%	97,5%
CIRUGÍA COMBINADA (N = 39)	INCC	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	15,8%	18,9%
Reintervención antes del egreso	2,6%	12,1%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	87,2*%	97,3%
Mortalidad operatoria cruda	5,1%	4,9%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0,0%	0,0%
CIRUGÍA VALVULAR PURA (N =94)	INCC	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	7,5%	14,2%
Reintervención antes del egreso	1,1%	9,7%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	91,5*%	97,6%
Mortalidad operatoria cruda	9,6%	9,2%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0,0%	0,2%
CIRUGÍA AÓRTICA FUERA DE LA EMERGENCIA (N =18)	INCC	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	22,2%	21,1%
Reintervención antes del egreso	11,8%	15,6%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	88,9%	97,5%
Mortalidad operatoria cruda	16,7%	11,4%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0,0%	0,0%
MORTALIDAD AJUSTADA POR RIESGO PREOPERATORIO ⁵	INCC	Valor nacional
Relación mortalidad observada / mortalidad esperada ⁶	0,84	0,96

¹ El valor nacional corresponde al valor observado en el total de los procedimientos realizados en los IMAE con cobertura del FNR.

² En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible.

³ Proporción de pacientes fallecidos a los 30 días de la cirugía.

⁴ En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible ya que se recomienda el uso de mamaria siempre que sea factible.

⁵ Se utilizó el modelo logístico del EuroSCORE ajustado a la población uruguaya operada en el período enero 2003 a diciembre de 2006. Se incluyen todos los tipos de cirugía.

⁶ Los valores superiores a 1 significan que la mortalidad observada fue superior a la esperable de acuerdo al riesgo. Al contrario, los valores menores a 1 significan que la observada fue inferior a la esperable.